

KADA STE SE ZADNJI PUT TESTIRALI NA KLAMIDIJU?

AKCIJA U POLIKLINICI BREYER: RIJEŠITE PROBLEM S KOJIM SE SUSREĆE SVAKA DESETA ŽENA

Infekcija bakterijom *Chlamydia trachomatis* jedna je od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Dok *C. trachomatis* može i u žena i u muškaraca izazvati upale urogenitalnog trakta, komplikacije tih upala u žena mogu dovesti i do neplodnosti. Kod značajnog postotka inficiranih simptomi mogu biti blagi i nespecifični. Procjenjuje se kako je jedna od deset žena u dobi do 25 godina zaražena klamidijom, a gotovo 70% njih nije svjesno zaraze. Može se pretpostaviti da je slična epidemiološka situacija i u muškoj populaciji. Stoga je vrlo važno da partneri

ciljanim testiranjem na *C. trachomatis* provjere svoj status i spriječe širenje te bolesti.

Poliklinika Breyer tijekom mjeseca lipnja organizira akciju testiranja na infekcije *C. trachomatis* u urogenitalnom traktu. Naime, infekcija klamidijom može se dijagnosticirati i iz uzoraka prvog mlaza prvog jutarnjeg urina, a ne samo iz vaginalnog brisa (žene) ili brisa uretre (muškarci). Kako bi potakli što više žena, ali i muškaraca da brinu o svom seksualnom zdravlju te spriječe širenje ove najčešće spolne infekcije, kroz mjesec lipanj u



Poliklinici Breyer testiranje na klamidije sniženo 50%.

Mikrobiologija Poliklinike Breyer koristi PCR metodu molekularne detekcije, koja je najsuvremenija, najosjetljivija i najspecifičnija (nema lažno pozitivnih nalaza) metoda trenutno dostupna na svjetskom tržištu. Za testiranje je dovoljno u Polikliniku Breyer donijeti uobičajenu posudicu urina (oko 50 ml prvog mlaza prvog jutarnjeg urina). Rezultati pretraživanja izdaju se unutar 10 radnih dana i nalaz može dostaviti putem maila, faksom ili putem www.lab-breyer.com